庫全書

子部

欽定四庫

全書子部

普濟方卷一百七十二

編修臣倉聖脈覆勘 校對官典簿日到景岳 總校官庶吉士臣何思鉤

藤銀監生臣都捷成

詳校官太陽院醫士 舒 低

積氣在右脇下覆上 於發肺癰以春甲乙得之所以然者肺主氣外合於 フラランニラ 聚門 故結為積失不己令人西浙寒熱 普酒す 如杯者肺積也氣上資街息有 师肺當傅肝肝以春適王 周王朱橚

半夏湯 都是四月全書 皮毛今肺氣留積故有寒熱喘软肺癰之病 右粗捣篩每服三錢水一盏東三枚擘破生姜半 胡士董斯各 胡蛄 半夏为先去滑 拍碎煎至七分去滓服食後夜卧各一服 す 治肺積息黄软嗽 桔梗炒 訶梨勒 桑根白皮炎 卷一百七十 甘草族 白术和 剉 細辛 月母出 前 柴

桃仁煎丸 というりませんとう 右為細末入桃仁硇砂煎蜜鎔和九 不能飲食胸膈壅悶軟嗽喘促 桃 食前生薑湯下十五九 者 加 木香分 鼈甲 两湯浸去皮火雙 酒三升 占 治息實氣右脇下結硬如杯心腹脹痛 半两去 A) 兩逢酥炙 昔満す 换榔 柯 猪牙皂 褐 砂煎 禰 九 仁 較美別判 ķip) 川鳥頭 青 半两去皮堂 研 如桐子大每服 विक 硇 剉 啊 砂 炮 黄 鹽 不 皮 火 抻 耐 防 鹏 石

防巴湯出聖 右除郁李仁麻仁外粗捣篩再同捣匀每服三錢七 麻仁り 防己 心午時各以利為度 八畫片數分拍碎以水一盞煎八分去滓温服空 惠力治息首氣在右脇下結聚脹痛喘促效軟 訶梨勒做 濟 梹榔 大腹瓜皮去 治肺積息實下魚 槐 卷一百七十 去 畃 陳橘皮湯沒 核 子 甘草失奶 用 白 焙 郁李仁为 去 桑根白皮 去

とこりられたち 右為粗散每服三錢水 鼈甲 浑不拘時候温服 甜样 恵す治息寅氣腹脇服硬欬嗽見血疫粘不出聖治息 郁李仁 半两匙 一两逢醋 Ē, 特済す 當歸 一盏生量半分煎至六分去 枳實业內处 换榔 桂心两半 詞科勒皮 五味子 白木

金げる ロった ノアラマ 大腹皮散出生治息首氣腹脇脹湍急效嗽坐卧不安 右為麤散每服三錢水 右為細散每服三錢水 大腹皮丸 候温服 甘草世西 皮 湯 仁处炒黄 梹榔 **j**·] 赤茯苓 川大黄 杏仁 木香 #ŋ -一中蓋煎六分去津不枸時 中蓋生薑半分煎六分去 两汤 碎一做啊 νŤŋ 仁处 前胡 洰 炒到 漢防巴 **ት**-ኮ **蘆一** 頭雨 微去 黄 皮 去 火 桃 訶梨勒

こうし **枝九也生治息資氣右脇下結聚成塊喘軟胸痛唱** 吐痰涎面黄體瘦 石為細末以酒煮麵糊和搗三二百杵丸如桐子 荆三稜 炮 浑不拘時候温服 **衛裂** 去 焙雨乾汤 做浸 木香內 醋拌 一兩炮剉 鼈甲 黄七 日母か 裮 фg 酞 襕 赵灿 湯 炙 汥 微雨 梹 榔 附子 訶梨

飲定四母全書 换柳散 枳實木香丸 右為末東肉和九如桐子大每服二十九用炒豆煎 湯下空心日午夜卧各一服漸加至三十九 每服食前生薑湯下二十九 枳實去狼处 香谷二 海樂水洗去 治息資氣胸腸妨實右脇下堅急上氣欬 治肺積息黄上氣 木香 陳橘皮湯浸去 与樂出

痛 嗽 右為麤散每服三錢水一中蓋生薑半分煎六分去 荆三稜》 浑不拘時候温服 青橘皮三分湯及 梹榔 赤茯苓分 治息黄氟令人喘效 心腹脹満脇下 訶梨勒皮公 郁李仁 去皮做 浸

木香丸 飲足四庫全書 少無力 右為麤散每服二錢温酒調下食前服生薑橘皮煎 湯下亦得 木香內 鼈甲 治息賣氣胸膈悶腹脇堅急四肢不和 鼈甲 福棚 徴 當歸 彻林 桂心 荆三稜

息黄湯 大からましたはの一気 酒酒寒热氣逆喘軟發為肺癰具脉浮而毛 右為細末以酒煮麵糊和丸如桐子大每日空心温 甘草 酒下三十九 枳實品做黃 治肺之積在右脇下大如覆杯久久不愈 桑白皮炎 吳茱萸鴻 甘瀬す 訶梨敦皮 桂心和半 慈少各二 দীয়

金りロハイニ 右剉為散每服四錢水 息責 者 分去浑食前服 **機搗篩每服三錢水一蓋生薑一** N-) 治肺積息黄上氣胸湍效逆 麩 調 焙 理東其教下 華慈級上州 木香 一方無人參 龙之 建却 卷一百七十 一盏半量七片囊二枚煎七 梹榔 用 今 紫 對 此病 有 分拍碎同煎至 杏仁湯浸 甘草 奺 杨 急炙 坐] 胁 吴朱 有 фŧ

光花煎丸 桑白皮湯 とこりり 右麤捣篩每服三錢水一蓋入生薑半分拍碎煎至 单段两到 桑白皮對 七分去津温服空心晚食前各 七分去浑温服空心食前日三 /states 两半醋拌 陳橘皮治於去 治息黄氣結塊在右脇下 治肺槓息贲上氣脹消效嗽涕唾膿血 参門冬士 心治 硇砂 柯 两不夾石者細研 猪牙包英瓜灰去 十两半 甘

皂灰丸 鱼人口无人! 右等分捣離為末煉蜜和九如梧桐子大每服空心 右為細末入芫花硇砂煎中 橘皮 皂荚 子大每服食前生薑湯下十九 心手 鼈甲 治肺積息責上氣 白雨 蛤 子蛀 剉者 裮 酞 襴 桂去蓝 入小蒸餅和為凡如桐 刜 乾薑地 坐] 貝 青 4

五靈脂九 右為細末棗肉和丸如桐子大每服二十丸生薑湯) 五靈胎 + 丹之類皆剛劑用之人以取陽補接真氣則可岩 下日三服 云補腎正所惡者古人製方益腎守濕潤之味 正 日午生薑湯下十五九加至二十九 · · 二两 治肺喘人而息實 脾惡濕肾惡燥如硫黄附子鍾乳煉 木香神 馬兜鈴士教 芋舷

推氣散 大東九 都定四母全重 喘嗽發腫壅始由心病傳肺肺當傳肝肝乗王而不 受邪氣留於肺結而為積其脉結溢謂之息資 右為細末每服二錢薑湯調服熱酒亦得不拘時候 枳殼炒 具後 補腎經也近世盛行香華几可補腎經亦有數方 治右脇下大如杯人不已令人洒淅寒熱 治證如前 桂心环 卷一百七十 甘草 5 片子薑黄申

肺之積息貢九此計治右脇下覆大如杯久不已令人 とこりか かた 治息資氣喘效心膈不利患力 右為細末入郁李仁研令勻毎服不計時候以生薑 右等分為細末熟囊肉為丸如桐子大每服三十九 **华**慈 湯調下二錢 訶梨勒皮西 米飲湯下 橘皮 郁李仁皮微妙研 台灣す 桔梗 木香

金片中屋子 右件除巴豆霜茯苓旋入外為末煉蜜九如梧桐 洒浙寒热喘嗽發肺癰 厚朴 垉 鈍 大每服二九一日加 一製去 桔梗銭 陳皮丝 巴豆霜 八里鏡製 川椒炒 紫苑 青皮分 白茯苓士)去诣 两三线炒 巻一百七十 九二日加二九漸加至大 白豆蔻 錢 錢炮 錢-川鳥頭 天門冬

加減息賣九出以中夏合其積為病寒熱喘嗽氣上奔 とこり自己的 脉溢失精又云血氣滯則短氣血凝溢則寒熱則氣 分寒血分熱治法宜益元氣洩陰火滯氣削其堅也 川鳥頭 始積減大半止服秋冬加厚朴半兩通前稱 便溏再從二丸加服煎淡生薑湯下食遠週而復 |銭減黄連七分只用六分 紫苑 乾薑 丝线 巴豆霜 桂枝 厚朴 橘皮 黄 দৌ

金りで見る 右件為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大初服二九 門冬出心 辛大料熟物之類及生冷物 再從二九加服煎生薑湯送下食前忌酒濕麵 責脈附論 日加一九二日加二九加至大便微應利為度 青皮女 桔梗纸 白蓝龙 錢 犴 荆三枝一致 紅花 許少 茯苓 天

乗心若心中踊踊如車所驚如人所恐五臟不定食 飲 志氣積於腎而氣上下遊走如脈之奔故曰奔脈其氣 夏得之也 奔脈氣者是腎之積也起於驚恐憂思所 得之何以言之脾病傳腎腎以傳心心以夏適王王者 とこりをとう 生若驚恐則傷神心職神也憂思則傷志腎藏志也神 不受邪腎欲復脾脾不肯受故留結為積故知奔脈以 上下無時久不愈令人喘逆發骨瘻少氣以夏丙子日 持済す

夫腎之精名曰奔豚發於小腹上至心下抬豚走之狀

發作 急沉厥者奔豚也其足乃收不得前後皆從驚得之腎 軟嘔氣滿胸中狂凝不定妄言妄見此驚恐奔豚之狀 金与口尼人 外臺祕要云師 乍劇翕翕短氣手足厥逆內填結痛温温欲嘔此爱 間有膿故也 奔豚之状也診其脉來觸祝觸祝者病奔豚也腎脉微 也若氟潘支心心下悶亂不欲聞人聲体作有時乍差 欲死復還生皆從驚恐得之腎間有 曰病如奔脈者氣從小腹起上衝喉 卷一百 膿故 也師 思 咽

治奔豚氣 **鈆丹丸主癲癇瘿礙此意相近鈆鞅解為馬排木** 縣官所捕迫逐驚恐者療用鸱頭鈆鞅千金方有飛鸱 恐得之火邪者桂枝如龍骨牡蠣湯主之若新亡財為 病有奔豚有吐膿有驚怖者火邪此四部病者皆從驚 即羚羊角所言奔脈者病人氣息逆喘迫上如脈奔 **状奔豚汤主之** į す 出直 档方 云

多是四周全書 沉香石斛湯此聖 右 右為細末每服二錢空心酒調服 **苓** 皮去 沉香剉 衝心胸脇 粗捣篩每服三錢水 白术 木饅豆丸者 Z. 与衛な三 石 五味子 斛根去 濟 次四 治腎臟積冷奔豚氣攻少腹疼痛 F 五并炒黄 并炒黄 陳麴世 一盏邁三片東三枚學前至 木香 巴戟天业 ٩ 两各 姚 肉直整にる نت 人参 监香 桂去 皮 赤茯 粗 啊

七氣湯 くいうこと たいう 右以水一斗煮取三升去滓分三服忌海 五臟欲絕奔氣不能還下心中悸動不安 質及女 六分去浑食前熟服 乾地黄 療夏勞寒熱愁思及食飲隔塞虛勞內傷 三两洗 斤 橘皮 桂心

多好四月全書 大香硫黄丸患力治肾積頻發小腹急脹疼痛唇口青 黑 右將 皮臍 木香 厚朴栝蒌蜀椒 肉錫生葱猪肉燕夷等 炮 皮 製去 粗 九味搗蘿為末與别研二味和勻搗研 沉香 銅青 硫黄 ᆀ 研 研 肉直卷太 各一百七十 青橘湯浸 梹榔 千金無桂心橘皮桔 剉 各 邨 懐香子 去 炒 池 附 有 子 桂

木香槟榔散與雖治積病不散結伏奔豚發即上街 CALITIME MILLS 心胸令人喘逆骨痿少氣 右搗雞為散每服二錢炒生薑鹽湯調下 勒核 木香 為九如梧桐子大每十九懷香酒下加至二十九 す無沉香 桂去粗 懷香子炒 换柳州 陳橘皮湯浸去白 普済す 芎藭 沉香剉 白止炒 磁石版 洗 牡蠣 訶黎

一多大四月五十十 神 亂 效丸 右搗雞為散每服二錢炒生薑鹽湯下 在腎經流傳并血聚如此漸成形冷氣結在臟因茲 木香 ぬ出録 沉香剉 啊 -治疝氣奔脈嬰孩渦松疝氣因何得那 青橘皮 治 桂しま 木瓜 皮 切風及腎臟奔豚氣上衡心胸悶 湯 柦 養一百七十 焙没 两各 建我大地 去 白芷 抄 杉木節 懷香子 砂 風

沉香丸 大王司 DE ALAMO 右将硇砂用水浸磁盏内沉去泥土留湯平頭頓成 温水送下 桂钱牛 膏子糠醋打糊為丸如菜豆大每服三十九空心 岑 腹疼本經無別法疎利樂通靈 惠才治奔豚氣小腹積聚疼痛或時上攻心胸出聖治奔豚氣小腹積聚疼痛或時上攻心胸)半两醋 青皮 木香 普済る 全蝎 梹榔 附子 炮 硇砂 换

懷香子九 金月口居有量 右件樂為末入硇砂令勻以酒煮麵糊和丸如梧 壅悶 榔 于大母服食前以薑鹽湯下二十九 沉香 生 用 硇 懐香子 **鉢聖** 濟 砂 赵 浩 逖 ŧψ 阿魏 ÷ 浸 去 治腎臟久積氣膀胱虚脹上攻膨 щð 微去 黄 浑 取清 央 卷一百 火 青橘皮 石 17 + 者 内 10 銀細 浅 研 练 煎 临两魁湯 易 戟 漣 湯 盖 徇 微浸 蛜 14 邺 梹 桐

大香賺魚九 は問す治奔脈痘癖心氣腹淌两腸 大三司甲 10十五 疼痛 右除煎研外捣靡為末同入煎内和捣丸如梧桐 橘皮的特 懷香子 大每服十五九至二十九空心温酒下 煎欖 阿魏印成 匀横 去 自然銅 取酒 徴 γψ 木香 為 硇 砂 狼毒炒 ηŦŋ 附子炮製 霜雨入半 阿研魏沸 煎 湯 吋 化澄 戊 热煎 焙

奔豚湯 金片四月日 **羣纯相逐撞撞時氣來便如作驚夢精光竭不澤陰** 右為粗未每服三錢水一蓋煎至七分空心熱服 牵引腰背屈伸不刺 尚香 青橘皮半两 小腹疼痛面乍熱赤色喜怒無常耳聾目視 療虚勞五臟氣之損遊氣歸上上走時若 投术谷三 木香 巴丑 去 ڪ 耳 ħ. 華澄茄 梹榔 香附子 用

賁弛茯苓湯 人工可归品的 **責氣走衝心腸發作氣欲絕不識人氣力羸瘦小腹** 右以水二斗煮得五升温服八合日三不知少増至 無精光 鳥根 れ魚 畫作二 **与樂水三** 升日三思羊肉錫生葱海藻松菜等 生李根切 當歸 療虛氣五臟不足寒氣厥逆腹脹淌 普滑す 甘草之两 半夏洗 桂心兩五

責化湯由な療育氣上衝胸腹痛往來寒熱 金月四月子書 右切以水一斗二升煮取五升服一升日三夜二忌 手足逆冷或煩熱 起腾踊如佻子走上走下馳往馳來寒熱拘引陰氣 茯苓咖 甘草灰 羊肉够海藻菘菜酢等物 啊 生薑西 芎藭 甘草灰 人参 當歸 生島い 李根白皮 黄芩谷二 當歸 ŧŋ 半夏至 ち樂

甘李根散 也有礼氣臍腹脹痛禽角短氣發作有時 大工司馬子 人 四肢疼痛 右以水二斗煮取五升去滓温服一升日三夜二 甘李根山雨 忌海藻菘菜羊肉鵖等 \$1 蘆頭 兩去 普済す 附子 焙乾微 梹榔 **庚两** 生島公 炒七 桂心 半夏易 甘李根好 兩 服 凿 浸雨

木香湯 金にスローだって 石粗鸠篩每服三錢水一盞入生薑半塊囊一 右為粗散每服三錢水 上街心 甘草成半 木香 **時候温酒調下二錢** 紫蘇並葉兩 治積氣不散外脹于臍腹間發似脈狀賁 桂去粗皮 桑根白皮到各 巻一百七十一 中蓋煎至六分去浑不拘 赤茯苓皮黑 陳橘皮为沒 梹榔 枚 去

李根皮湯 とこり目には 右吹咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去 浑温服 附子 李根白皮凶 破煎至七分去滓温服空心日午近晚各一服 四租内度 皮 啊 膌 治責脈氣從小腹奔衝上心昏亂嘔吐 炮裂 治貪脈氣衝心吸吸短氣發作有時 **X**. 乾薑也 二 阿 桂

動与口唇白電 木香九 痛甚 右為末煉蜜為九如梧桐子大懷香子或薄荷酒 桂皮粗 沉香分 木香 一十九一日三服臍下有塊一月永除 治實脈氣上衝胸膈壓氣 青桶皮出白 吳朱萸 丁香 巻一百七十 白蓝龙人 啊生 宿 附子也段去 沉香当 肉韭起去数 懷香子以各 梹榔 坐] 雨

奔豚湯 とこうらいう 結謂之賁脈 傳心心乗王而不受邪氣留於腎而為痺積其脈沉 右除麝香外捣籬為末入麝香研匀用硇砂煎猪猪 下無時久不治病喘逆發則欲死由脾病傳腎腎當 甘郁李根皮 膽汁和丸如梧桐子大每服温酒下二丸 治從小腹衝心胸咽喉發病如纯奔狀 普濟す 當歸 川芎

尚香金鈴丸 金石四月月 右為細末酒糊凡梧桐子大每服三五十九温酒鹽! 右剉為散每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去 金鈴子 香炒做 **滓服一方用乾島無乾薑** 甘草 馬蘭花 絲嘴 山茱萸 黄芩 每箇判作 冶奔豚氣 杪 一百七十 吴茱萸为沈 青皮 热去 缰琵 四 片 半夏地 機装 陳皮上上 叼 必 劆 柯 食茱萸 啊 去 ት 尚

瘵奔豚氣從下上者湯方 奔豚渴 C1.135 右以水一斗二升煮取五升去滓温服日三服夜 甘李根白皮的五 湯下食前服醫學發明名茴香練實丸有先花 兩酷炒糊丸量虚實加減以利為度 服忌羊肉餳生葱 CILLIA 柱心两二 療手足逆冷胸滴氣促從臍左右起機 生島西 半夏五雨 生量西 İ 黄芩

赤茯苓散 動力四個分量 悶胸中短氣坐卧不安しると 右以水一斗五升煮取五升去滓温服 赤茯苓 一忌海藻松菜生葱 桂心 高良薑料 लेंग 治奔豚氣從小腹起上至心下妨脹壅 啊 枯姜 李根白皮切 大腹皮料 訶黎勒皮 骶湯 人参格二 兩 葛根午 梹榔 吳茱萸! 芎藭 升日三夜 桂心 啊

桃仁九 シェンファロ July 右搗離六味為末入桃仁煎丸如梧桐子大每服十 右為粗散每服三錢水一中蓋煎至六分去滓不拘 桃仁 時候捐熱服微利兩三行為度一方無梹榔 五九至二十九空心温酒下 湯浸去皮尖雙仁炒 沿温 治腎虚積氣 懷香子 少各 酒二升煎成膏 乳盖分 木香皮粗 换柳分割 青橘

七寶九出聖濟 銀行四月在重 右除煎外捣研為末用前煎和丸如梧桐子大每服 挨黎子的去 息な治奔豚氣上攻心胸喘問脹淌 九炒生薑酒或炒生薑黑豆小便下 仁两 鼓湯 沉香当 治奔豚氣上衝脇肋疙痛 去皮尖 木香春 卷一百七十 硇砂煮湯 慎香子 **成膏凡諸樂各** 附子 此教去 木香 陳趟 梹 酌

硇砂煎丸患力治奔豚氣在小腹積聚成塊發歇疼痛 人工可戶 1115 右為細末入桃仁令勻硇砂煎中入少蒸餅和凡梧 右為散研入桃仁郁李仁令匀每服不拘時候温酒 防葵三分則碎醋 桃仁 硇砂 調下二錢 郁李仁士皮做 赵 赵两炒汤 微黄研入 黄 ήT 炒浸 き満る 热令成膏 木香 酒 吴茱萸业的易沒七 换柳~ 附子 去皮臍上一兩炮則 İ

天雄丸 兵郎 九出 聖濟 動分口尼白書 吐疼痛 右為細末以猪膽二十枚水煎如錫和前六味末捣 香研分谷 梹榔 桐子大每服食前以温酒下十五丸 一千下丸如小豆大每服空心嚼破七九煖酒 Ľ 滑 桂 治腎積氣資脉從小腹上衝心昏亂嘔 治奔豚氣上下攻走疼痛 木香做炒 粗 青橘皮去白 吴某英場 麩 南 炒 洗 安息

木香九出生海治賣豚氣臍腹左右堅硬横連如臂若 ここうこと ここう 弓弦急痛 右為末用狗裏外腎并膽細切就器中以無灰酒 空心生薑鹽湯下 木香 斤煎成膏加樂末為丸如梧桐子大每服二十九 大雄将一两 粗 蜀椒 鼈甲去視 襴 乾數半两 訶黎勒皮 懷香子炒 青 桂皮

苦練丸 此致 治奔豚及小腹痛不可忍者 制定四月全量 右用酒三斤煮酒盡為度曝乾或陰乾捣為細末每 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九温酒下如 岩練 至四十九 共為末酒糊為丸如梧桐子大每服百九空心酒 **两樂末入全蝎十八個玄胡五錢丁香十五個** 吳茱萸 尚香香一 一两牛炒 黑附子士皮聯 牵牛子 南

奔氣湯一名朱英湯療卒厥逆上氣氣入两腸心下痛 **潘淹淹欲絕此謂奔豚病從卒驚憂怖得之氣從下** 右切以水一斗煮取三升分三服此樂湏預蓄得病 上上衝心胸臍問築築發動有時不療殺人 甘草灰 便急合服忌海藻菘英生葱羊肉千金方桂心五 - 如痛甚煎當歸入酒大效 出千金方 桂心丽二 人参名三 吳茱萸 半夏洗各 ż 斤

治奔豚氣在心胸逆満悶亂此點 飲定匹库全書 懷香兵鄉散出聖濟治奔豚氣成塊上街腹脇淌痛 右為散每服二錢水 半夏二两湯 懐香子ル 候梢熱服 雨甘草三兩 次焙乾微炒 滑浸 梹榔 桂心 剉 梹榔 中蓋煎至六分去浑不拘時 荆三稜烟 啊 甘草半两 木香分 蘆頭 啊 剉 去 青 吳

撞氣九出坐濟治腎藏氣發攻心動築人心腹面黑問 とこりをという 急用此 右将鉛於銚子內慢火炒令氧入赤石脂末急手炒 欲絕及諸氣奔豚喘甚婦人傷冷血氣發攻心等症 右搗蘿為散每服二錢熱湯調服不拘時 鉛 橘皮湯浸切鹽 轉莫令烟起以水微噴之慢火再炒令乹傾于淨 赤石脂二两 兩 木香為末 麝香研 Ļ

食氣湯出百 金月四月月十日 茴香炒 諸樂相和研之以栗米飲九如鷄頭每服用二九 即以炒豆飲令氣下便服此樂無不驗 通每一九入玄明粉半兩如氣淌胸膈服藥皆吐 研破熱酒浸之頓服或下氣或通轉即愈如祕 地坑子内以蓋子覆之候冷取出細研 白荳蔻仁 3 丁香各半 散寒氣亦治奔犯 冬一百七十 良量三两 麻 甘草 如麵次 不

治奔豚氣逆上街心淌問臍腹虚脹出生 とこりをからう 右㕮咀以水|斗煮取三升分三服忌海藻菘菜 右為細末毎服二錢入鹽少許沸湯調下 梹柳 傷損食下則覺胸膈痛慄然水将下 焙乾 廿草 訶黎勒皮內 麥門冬二片 木香西 食前服 桂心

金月四月 白電 换榔散 右捣雞為散每服一錢童子小便半盞空心調服不 右為細散每服 **来**與陳者湯洗始 换榔剉 過三服效如患陰陽二毒傷寒及脚氣亦可服 總銀 和調下不拘時候服 總出 録聖 濟治人積奔豚氣時攻膀胱切痛 可黎勒皮 母上两 治奔豚氣街心潘悶 錢以温酒 卷一百七十 合童子小便一合相 牵牛子做 两炒 吳

磁石散 牡蠣賣豚湯 く・ブラシ 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五九空心温酒 右捣研為散每服三錢乙以生葱] 整細切熱酒投調 磁石烧醋 蜀椒 牡蠣 越銀 治奔豚冷氣上衝昏亂四肢輕弱不收出生濟治奔豚冷氣上衝昏亂四肢輕弱不收 List 两 切焙 桂心の 肉直乾粒 療責豚氣從小腹起憧胸手足逆 懷香子炒 李根白皮切 木香 附子炮縣去 **梹柳**一判 甘草处

療手足逆冷胸湍氣促從臍左右起鬱胃者 動定四庫全書 右切以水一斗七升煮取李根皮得七升去滓内餘 右捣篩作九散隨宜酒服十九如梧桐子大者方寸 菜 樂再煮取三升分五服日三夜再忌生葱海藻 伏出鷄頭卵殼中白皮 療三十年喉中結氣效逆立蹇亦可水煮為湯以 紫苑谷等 黎木灰 麻黄 卸去

吴茱萸飲 無致治腎臟久積成奔豚氣小腹急疼發 とこりをという 神煎此坐濟治賣豚氣上衝心腹 右同炒以黑豆熱為度同童子小便一升浸少頃煎 即不識人 意分之 至六分去浑分三服空心日午夜卧各 吳茱萸培乳 浸研細取汁三升去皮火雙仁四两湯 桃仁學仁各一分 荆三稜煨割 黑豆两半 鼈甲

茯苓桂甘湯此直治臍下悸動效而奔豚 治奔豚氣上下街走悶亂面青出 金片口尼 子童 右判細每服四錢棗一枚用甘泉水一蓋半煎一蓋温服 右搗二味為末先煎桃仁汁至二升次下藥末不住 茯苓四二 服半匙空心好酒下 手欖良久更入好醋一斤同煎如鍋以瓷合妆每 去裙 炙三分 棚 醋 甘草两半 百百 桂心 两一 聖

久元 9 mm 人一時 治奔豚氣過す 右為粗散每服一錢水一中盞煎至六分去滓不拘 右兩箇半炮帶性兩箇半只生用並吹咀分四服用 時候熱服 訶黎勒 甘李根皮二两 水二大益入新紫蘇三十葉岩陳者添十葉煎至 八分遇發時半飢半飽服急時不拘時候 换榔的四周 告酒す 吳茱萸遍時乾微炒 生量之

をないく ローだ インコー 東子酒出仁治奔豚氣 沉香湯 無聖海治腎積化氣 右剉碎麻豆大每服三錢水一中生薑一分拍碎 子炮製去 沉香 湯 七分去浑温服空心日午前各一服 焙浸 去 石斛根 黄耆 高良量西半 甘草 五味子炒 巻一百七十 人参名三 牛膝酒浸切 巴戟天士 桂皮虫 懐香子ル 陳橘皮 烏樂 附 煎

大工口豆 人 治奔豚氣上下街走問亂面青出聖 治奔豚氣 右用斑蝥一 右以醋酒各三分盏煎具朱萸十餘粒候三兩沸用 松郎三枚梅 斑蝥在内用濕紙包文武灰中煨熱去斑蝥不用 調平胃散三錢空心服此樂有功效但不能去根 将東子細嚼熱酒送下空心服之 散出百一選方 名长英平 一枚去足頭翅好肥棗一 生薑命 普瀬す |枚擘開去核安

育之積奔脈九 此就發於小腹上至心下若脈狀或下 桂枝加桂湯出指治奔豚氣 金月口是 分量 或上無時久不已令人喘逆骨痿少氣及治男子內 右為粗未每服五錢水二蓋薑五片棗一枚煎一 右件樂以童子小便一大蓋微燒過入前樂二味攪合 去浑服 官桂江 与樂公 **匀分為三服如人行五六里進一服須臾下利為效** 卷一百七十 甘草西 一盏

結七疝女人痕聚帶下 右除巴豆霜茯苓另為末旋入外為細末煉蜜為丸 7 烏頭幾半 厚朴女钱 獨活线-漸至大便鴻再從二九服淡鹽湯送下食前週而 如梧桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸 全蝎炎 丁香針 黄連五钱炒 附子 澤寫 二去 线皮 普番す 肉桂二分 **告練酒煮** 巴豆霜如 白茯苓去皮全 胡玄索 菖蒲线 ŧ [ונ 錢

解鈴丸出杨氏治奔豚氣疼痛手足拳縮不可忍者 飲定四年全書 右件為細末酒煮麪糊為九如梧桐子大每服三十 尚香 大用紙數重義 復始病減大半勿服秋冬加厚朴半兩通前一 存性牡蠣三錢癩疝帶下病勿如 凡温酒鹽湯送下空心食前服 二錢如積勢堅大先服前樂不減于一料中加燒 りありり 剉碎 啊 兩 研 蝎稍奉 分 去 兩

奔豚湯血す治氣奔急欲絶者 木香散患女治奔豚氣上衝心胸悶亂臍腹脹痛飲食 てこりき とこう 轉嘔 右十二味吹咀以水七升清酒八升煮取三升分三服 木香 吳茱萸十 茯苓谷十 桂心 青楠皮 石膏 當歸分 ち樂 人参 李根皮 生薑分四 梹榔 半夏 白术 生葛根 芎藭

治奔豚伏梁氣及內外腎釣并霍亂轉筋 多方四周全書 内經謂病肠下潘氣逆二三歲不已病名曰息積夫消 右件樂搗細羅為散每服不計時候以温酒調下 葉搗傅外煎水洗脚 逢我戊母 以椒葉和艾及葱研以醋汤拌胃並得一方以椒 息積附論 沉香內 杉木卸申 複香子两半 百七十 木瓜后轨 柱心

導引法 故湍逆而為病然氣不在胃故不妨于食特害于氣而 息者陰陽之更事也今氣聚脇下息而不消積而不散 引能行槓氣樂力亦精導引而行故也 欠とりをたれる 已其法不可炙剌宜為導引服樂樂不能獨治者盖導 右以兩手拇指壓無名指本節作拳按桿趺坐扣齒 是三則以氣通為效遇子午卯酉時則行然按摩 三十六屏氣二十一息縣氣三口再屏息再照如 療厥逆上氣氣攻兩脇心下痛淌 普済す 毐

化氣湯四十治息積癖于腹脇之下偏脹膨淌不好飲 金いるせんろう 勝氣婦人脾血氣 食鐵樂不能取轉及治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小 縮砂仁 香炒 導引之法甚多隨意行之皆不必枸此法 達木地各 丁香皮 桂心 啊 切氣逆貿腸噎悶 冬一百七十一 胡椒 青皮沙 沉香各 陳皮 一字 甘草炙 錢 生軟量 尚

沉香丸 九九日日 1:15 桔梗丸 右捣籬為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九温 右為末每服二 酒下日再服漸加至三十九 歸 甘草 冶息積脇下氣逆妨悶喘息不便呼吸引痛 白术 治息積脇下氣逆妨悶歳久不已 一錢薑蘇鹽湯調下婦人 **乾 越甲去視欄** 大麥集炒 杜出 醋湯調下 吳朱 İ 當

白木九出海治息積脇下好問喘息氣逆呼吸引痛不凡 金げてん ろうし 右九味捣蘿為末煉蜜和九如梧桐子大每服二 梗炒剉 沉香剉 白术 划煨 凡橘皮汤下漸加至三十九每日二服 黎勒皮 木香香三 陳橘皮湯浸去 枳實麵 桂しま 青楠皮湯浸去 粗 桂-士 椰二煨 甘草 白木 各 各 人参 剕三 桔 訶

乔茯苓湯 ストララを 右粗搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓空心 右搗蘿為末煉蜜和九如梧桐子大每服二十九温 温腹日晚再服 赤茯苓士黑皮 酒下不拘時日三服 軋炒 1.13 两半 治息積脇下氣逆満悶姑脹 焙 大腹川牛 訶黎勒皮根去 髙良薑 **去湯**白浸 吴某

理氣九出作治脇下淌氣逆不妨于食連年不已由風 動沒四個全書 枳榔散 寒之邪客于衛氣伏留不散聚于膜外所以不妨于 右為末煉蜜九如梧桐子大每服畫湯下二十九末 食謂之息積由出入之息以感疾也 橘紅 知加至三十九 杏仁去皮头 啊 治息積肠下氣逆淌悶 桔梗 桂心 **换椰谷** 木香

敗濁潰為離膿多致不枚 氣逆息難竭 日頻年醫所不治人則禁衛停凝 石廳搗雞每服五錢七水一盞半煎至八分去滓温 7 胡椒 梹柳 服空腹日二服 因す治腸胃因虚氣癖于肓膜之外流于季腸 陳者淘七適焙 **粒** 百 五 訶黎勒《 啊 木香分 普湾す 雨核 全蝎 枚 Ð

膩 **秘定四席全書** 陳橘皮湯 脈腑 右為未栗米飯九如菜豆大服十 右麤搗篩每服三錢七水 枸胩去滓温 陳橘皮 柶 佛故 不 積 和 聚心腹脹淌 则 令 血氣留 治息積脇下氣逆淌 倍浸 轧去 心腹 服 具菜英陳者 滯 附 一百七十 周 而成積聚總結氣不宣通 淪 煩満 一盏入鹽少許煎七分 短氣者為寒邪所 悶 水 ħ. 日橘皮湯 淘 بر 砌 :大 與

木香三稜丸 則傳于腑陰陽相擊而致心腹疼痛甚則泄利也 欠己り 同人 效如神 化四肢困倦嘔逆惡心口告無味積滯冷物不思飲 食癥瘕疣癖堅硬氣塊並宜服之小兒傷食服之其 木香 甘松洗水 方 丁香 良薑 治胸膈痞悶腹脹淌脇肋痛食飲建 砂仁 厚朴繁 紅豆 香附子 夫 薑屑 炒 枳

出る中居人門 右為細末滴水九如梧桐子大毎服四五十 親節 半 實炒 稜 白 白荳蔻 枳殼 鷄爪三稜 食後服 抄 丁香 卷一百七十 神麴 梹榔 雷九 沙 醋 啊 青皮私 荆三棱 浸 青木香 華澄站 甘草 九温生 陳 石三

太乙神明陷水丸 とこつられ とれの 結氣咽中閉塞有進有退繞臍惻惻隨上下桉之跳 思注長病欬逆睡噫辟除衆惡殺鬼逐邪惡氣胸中 手心中愠愠如有蟲狀毒注相染滅門 雄黄 肯 油煮 豆豆 参 真珠 丹砂 奇滑す 犀角 治諸疾破積聚心下支淌寒熱 蜈蚣 附子两4 磐石 鬼臼 蜥蜴牧 當歸 麝香 射岡 光青 黄

冶 金万四月子 腹中冷發甚則上槍心氣淌飲食喜嘔血 右為末蜜和搗三萬杵丸如小豆大先食飲服二 心腹疝瘕肠下 傷寒服之無不即瘥 近家及視病人夜行獨宿服二九令衆惡不敢近 如 枚 不 知稍 地膽壮 烏頭 如仍以樂二九安門户上使衆惡不敢 枚八 及小腹滿堅痛有積寒氣入腹使 ید 杏仁如十 桂 الا 两三 班蝥 枚四 -}-樗鷄 丸

沉香餅子院才 治飲食停積胸膈痞湍脇腹疼痛 Kalina Listin 吐不止 右為未蜜丸如梧桐子大每服五九日再漸加之 從客 萸 大黄 厚朴 男髮灰中 細辛 庭蟲八年 半夏的 青清す 牡丹 桂心 蜀椒 甘草 防獒 芎藭 7 嗯

動玩四月 全世 一 右為細末打白麵糊丸如小豆大揑作餅子每服七 沉香 皮 後服 餅子漸加至十餅子更量虛實加減温生薑湯食 H 益智 紅豆 乾漆烟烟 荆三稜 木香 褐 訶子皮 出 桂皮去 一百七十 梹椰 慢 肿 縮砂仁 霜香葉 青皮 半夏 巴豆 硇 砂 陳

参今九 總録 治植聚脹淌減食黃瘦 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服七九空心温酒 紫苑土苗 桂 炮製去 焙 下日再漸加至十九以知為度 へ参 枳實去縣 甘草人町各 乾薑地 亦茯苓吐黑 蜀椒去日并刚 當歸始 出汗各 烏頭炮栗去 細草去苗 麥門冬出心 两 厚朴去粗皮塗 炒 桔梗 汁炎 附子 炒

動定四周全書 右 煎至八分去滓温服 **剉如麻豆大每服五錢水** 昋 桃仁去皮尖雙 犄 桂皮 фg 出聖濟 總錄 各 柤 治積聚心下脹淌甚則泄利氣不升 般去姚 赤石脂 桑根白皮 仁 巻一百七十 附子皮斯士 當歸 **一剉** 两焙 大腹皮 一盏半入生薑三片同 各 肉盖卷士枚 白术 荆三棱 根 黄連 剉煨

ところを ところ 右為粗散每服三錢水一 桂心两牛 **訶黎勒王** 至六分去浑每服食前稍熱服之 剉 患か治積聚心腹脹満不能下食四肢瘦出聖治積聚心腹脹満不能下食四肢瘦 **去白瓤焙** 三分 荆三稜半两 煨 木香乳 普湾さ 一中盖生量半分東三枚前 厚朴 梹榔 炒 剉 粗皮塗生 白术科 前胡牛馬去 黄 热 蘆頭

金万四月月 硇砂 右捣籬十味為末用酸醋半升于銅石器內 當歸 礼 没樂末同熬成膏放冷别 硇砂巴豆三味慢火煎漸添醋 剉 另 搗 鼈甲 切培 芎藭 治積 两炒 鳥頭 炎去 各 各相 不消心腹脹淌 襕 臍去 皮 卷一百 硇 砂 烟剉 巴豆 别 出 研分 入陳麴末一 青楠皮 化氣消積 出 根 没樂 申 升 分剉 膜 焙去 Bp 研别 各 兩半 皮 一十味 荆 桂 F 光花 皮去 粗

鳥頭丸 大元司臣 氣也 氟行不宣通還轉於腑臟故心腹脹滿則敛悶而結 枚中皆有飯食即愈病源云積聚成病蘊結在內則 排手寒中有水上氣女人產後餘疾大人風癲少小 五服樂即出蟲長一尺餘三枚出復如牛膽黑堅四 風驚癇百病之症元嘉中用療數人皆良有一人服 凡袋豆大每服三九至五九茶酒生薑湯任下 Lister 1 療心腹積聚脹滿少食多見繞臍痛按之 台灣す

消痞丸 金月 揭篩 四周分言 桂 烏頭 五丸忌猪肉冷水醋 分 不能 الات 黄連 枯 煉蜜和丸 炮七 治積濕熱毒 飲食者疾弱 梗 枚 柴胡 分兰 如梧 分三 -15 物生葱羊肉锅 桐子 附子 甚者身體面月黄心肠 以運 蜀 大二九日三 炮三 動 分 咽嗌 子分 出 Б. 负兼 分 不 妙 菖蒲 有 す 無 加 腹 至 附 厚 淌

とこりなんか 右為細末滴水丸如豆大每服十九新水温亦得 **傳化失常小兒府積熱** 衂血下為大小便血傷風痔漏三焦壅悶雞熱中渇 **尫賍悸膈熱坐卧不寧心火有餘而妄行上為嗽血** 黄連 兒丸麻子大病本濕熱為佳 梔子 木香料 黄芩 藿香 大黄 厚朴 尚

快活丸 金号电信 台書 右為細末滴水發丸菉豆大每服六十丸用生薑 木香 加廿松麥縣中 三稜分三 食後 枳殼 總錄 治胸膈飽悶 橘紅 治積聚心腹脹淌不思飲食 廣木 華澄茄 冬 青皮 Đ 神麴 白术 縮砂仁 甘草 轧生量 梹榔

膈不通 右除研外搗蘿為末一處研勻用重湯煮蜜丸如梧 7 黄研 沉香 丁香內米 桐子大每服三丸煎橘皮湯下 炙 超鍊 治人積氣不散心胸滿悶四肢不收痞 胡椒 硇砂 木香 研 髙良薑の 普濟す 梹榔 剉 巴豆霜 丹砂 阿 Ī 錢 硫

動定四母全書 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九生薑木瓜 茯苓去黑 湯下 枳實出很影 出型治積聚心腹脹淌食少 大黄果刺 甘草炒 皂荚 各 青木香 白术 草盖寇士皮 昆布 鹹洗 焙出 桂皮去 梹 一两 榔 皮塗 粗 剉 酥 訶黎勒皮 島浦分 赤 白浸

內直卷散出聖濟治積心腹脹淌宿食不化氣刺污 次己四五人二 右為細末煉蜜和搗三二百杵如梧桐子大每服於 泄寫善噫吞酸食欲嘔吐手足逆冷 桂心如 孰 食温酒送下二十九 分去 珂 炒焙 川椒 川鳥頭 曹滑す 皮雨 刚 臍炮 製 汗 厚朴近生進汁 吳朱萸 一兩去粗

荆三稜煎湯無聖濟治腑臟不和氣血留滞積聚痞湍 金とないた とう 心腹好悶食物減少煩悶短氣 石搗雞為散每服二錢煎木瓜生薑湯調下 膌 白蓝龙三女 肉直起去数 髙良薑 大腹 陳橘皮出 卷一百七十 皮 粗 剉 人参严 延胡索 丁香 桃仁湯沒 枳殼炒去 木香 附子炮縣 天雄 甘草 皮裂

たこうなんな 開結導飲九#妆治飲食不消心下痞悶 右吹咀如麻豆大每服四錢七水一盡半入生薑 右為末湯浸蒸餅為九桐子大毎服三五十九至七 麥蘗麵 陳皮 片煎七分去淖温服 机 當歸 白术 如有積塊加巴豆霜 半夏製各 硝石酚 澤鴻 两 **乾生薑两** 茯苓 一錢 枳實物 旱 炒麯 分

金片四尾有量 沉香降氣丹 石為末生薑汁浸蒸餅為九如梧桐 青皮好 沉香 離匐子马木 九橘皮汤下 九温水下 陳皮士 親儒 台 木香 計 食速服 大黄 整一 廣茂煨 縮砂仁 切氣聚胸膈 6 兩 腹疼痛 枳 實赴 脹淌 子大每服三 白豆鬼に 炒 不思飲 雨二 ٤ 兩 エ 食

消宿食 右為細末用膏丸如小豆大每服生薑湯下十九至 į 巴豆咖山油油 **丁五丸温凉水亦可以意加减以和為度** 總量 淬 皮 治積聚心腹脹満利胸膈散 尚香少香 官桂

欽定匹庫全書 右為末酒煮麵糊九 補骨 沉香 下早晚食後服 總 缺 壁 稜剉煨 流 乾 兩 治積聚不消心腹脹淌 啊 各 木香 青楠皮法 五靈脂 如梧桐子大每服十九生薑湯 烟 青橘 湯 肉盖卷去 白 皮为焙浸 浸 焙 梹 榔 去 陳橘皮 啊 剉 荆 白汤 焙浸 去

化氣丸 疼不止 右為末每稱樂末一兩用去皮心膜巴豆仁稱 7 新汲水浸化旋入臼内搗千百下候硬軟得所丸 不快酒甘草湯下 如麻豆大每服三錢食後臨卧熱水下心胸痞悶 净臼捣極細方入樂末再搗匀用硇砂末半 1.1. 冶柴衛壅滯流傳臟腑脹淌飲食不消 墨处 分

動定四庫全書 木香枳實九 食遅化 右為末以麵作糊 **薑鹽酒下** 木香 去 白浸 草盖寇士皮 枳實 两炒 青木香 治濕飲停積胸腸痞悶消痰快氣宿 如梧 **乾生薑** 訶黎勒 梹 桐子大每服二十九 椰 核煨去 萊菔子 青桶 炒研

連翹九 とこりをこれる 肢虚腫行並不能但是脾胃諸疾並宜服之 嘔醋心飲食不下胸腸噎塞脇肋疼痛酒積面黄四 右為細末水煮麵糊為丸如桐子大每服七八十九 温姜湯送下 梹榔 治男子脾胃不和氣滞積聚心腹脹悶乾 ... 陳皮四十两 啊 = 普濟す 縮砂仁 青皮洗 白木 **建我茂地** 7 澤寫

硇砂 氣臟腑 右為末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九生薑 儿 椰 硇 肉桂 下久患赤白痢及大腸風秘脾毒寫血黃連煎湯 下婦人諸疾薑醋湯下不拘時候孕婦莫服 砂 不調或松或泄 1 見粗 入雨 治積聚不散心腹脹淌嘔吐酸水惡聞 皮 火 酷 好墨 四 六服 畃 T 棚间 + **5**-11 雨 5 鳥 三棱 肉荳蔻 十炮 啊 核 两十 Đ 孙 迥 食 湯 梹

とこりらんか 飲食 三稜散 右搗研八味為末今勺以硇砂糊九如菜豆大每 豆霜 丁香 九至三九煎丁香鳥梅湯下食後服更量虚實絮 梹榔 治積聚心腹脹満醋心嘔吐冷痰不思 没樂研 剉 青橘皮 普湾す 湯浸去 焙 益智此皮 埘 出 縮砂

砂香丸 第一分四月 白電 右 右搗雞為散每服二錢沸湯點服不拘時候 溥 研細未如彈丸大量虚實加減夜半後龍腦漿水 丹砂 堅者加至十九皆以針刺作數孔 粒 下虛藏即丸 旨 Đ 四 南研 冶虚實積潮熱心腹脹淌疼痛 研 松霜 中口 黄研 小豆大每服三九龍腦米飲 参一百七十 腻粉 龍腦 石井 ' 麝香研各 以行樂力小 蠟 兩二 巴豆 皮去 金

沉香散 次是四年全部一八 腹污痛面青口乾 桂湯 右搗雞為散每服二錢炒生薑湯酒調下 沉香当 取積丸如菉豆大每服三九叉治小兒吐逆米飲! **皮**湯 湯 浸 去 兵都半 烈 治積聚心腹脹淌痞塞不通大腸結燥腰 治心腹潘悶胸脇氣壅作痛 青木香当 大黄煨 普泊す 訶黎勒皮 剉 陳橘皮湯浸去 各 各三 粗 皮 柯 白 枳殻 郁 队去

飲食 右粗捣篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後 坏五槓丸 沉香当 温服 草 薑黄 粗 木香 陳橘皮母 青桶皮齿 木香 治五積氣嘔吐酸水心腹脹悶不思 与樂 白 甘遂 白 梹 荆三稜 榔 枳殼去數 芫花 當歸 焦醋 中 44 焙切 U

又方 治小腹堅大如盤胸中脹尚食不消化婦人瘦齊者方 文上司 Total 19/ 右暖水服髮灰一方寸七日再并炙肋端 右為末湯浸炊餅和丸如梧桐子大每服七九食後 右飲服上 壯瘥 臨卧橘皮湯下加至十九 |好麴末服方寸七日三又炙三焦腧隨年 普灣方

治諸積膨脹淌痞塞不通等病 金りせんと 丁香凡 右用小黄黑豆二分温水浸去皮禽黄光花一分醋 食不消 **潟只用冷水送下** 炒黄色共研細滴水為丸如菉豆大每服十五丸 更自量加减要取潟積滯可用温熱水送下不欲 丁香 丁香治積聚留結心腹脹淌胸腸痞悶宿 木香 食一百七十 沉香判 安息香

というらんな 右先将安息香硇砂乳香三味細研用少許酒浸良 前三味酒煮麵糊丸如麻子大常服五九至七九 熱水下若氣痛甚即如十九生薑湯下亦得 梹 **外别研巴豆砂并十一味捣蘸為末合研令勻用** 皮去 榔 急線裹週 華澄站 荆三稜 硇砂 普濟す 剉 當歸物 丹砂 附子将一分 陳橘皮 肉直乾数 禹 焙 匂 巴豆

金万四月 肌體羸瘦 無丹砂 剉炮 啊 惠古 "理治積" 煙榈 微 聚氣心腹堅脹飲食減少面色姜 出碎 晒 湯 剉 鼈 附 P 麩 皮瓤炒)1] 桂)]] 12 臍炮 福酥 製 欄象 刜 訶 出 炒剉 PA) 稜 厚

鼈甲丸 とこうう 石離為細末以酒煮 **段時惡寒** 鼈甲去視欄林 大每服食前以粥飲下三十九 桔梗炒 A.L. 治腹内積聚心肋急淌時吐清水不能飲 云粗皮 白术 枳殼 生 防葵剉 普湾す 麵糊和搗三百杵丸如梧桐 當歸 换榔 ¥'] 附子皮料 ij 前胡琳 剉炮 蘆 去

五積九 金方四個有電 石剉為末用水一 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九温酒 光花雨* 酸石榴布 晚各一 五靈脂 桃仁雀肉并苋菜魚蒜等 服漸如至三十九 治五積氣心腹脹悶噫氣吞酸不思飲食 豉 荆三稜 카 巴豆和 卷一百 煮合水盡炒過勿大焦捣為 甜華慈多 大黄 一方用枳實無枳殼忌 甘遂 烏梅去枝 杏仁生皮 弋

というう 右為細末以醋煮麵糊丸如梧桐子大每服食前以 榔 温酒下二十九 末醋煮麵糊丸如菜豆大每服五丸食後温湯 惠力治人積聚氣不消心腹脹淌食少體瘦出生治人積聚氣不消心腹脹淌食 2:1 火雙仁鼓炒微一兩半湯浸去 炮一刨雨 附子 桂心 通焙乾微牛两湯淡 皮 臍炮 製 鼈甲也兩 ツャ 青橘皮 乾漆 烟樵 梹 出碎

鼈甲煎丸魚十治積聚氣久不消心腹虚脹不欲飲 金江四月全書 右為細末內前煎中更加少蒸餅和搗三二百杵丸 已上三味並捣籬為末以醋二升煎今如膏 鼈甲 桐子大每服食前生薑橘皮湯下二十九 今两上 杩 做雨 貴 杜 裆 酞 桃仁 碎 出 橌 炙 桂心分三 一百七十 防灰 处沙 雨 湯 徴 淡 附子 微雨 皮失 别 炒剉 去皮腳炮 研 川大黄麻炒 製)1

仙九出生海治消食化氣破積聚結心腹脹滿意酷 惡心 右為末用酸栗米飯三兩匙再入臼杵五七百下 荆三稜煨 7 如要宣轉十五丸更量虚實加減 如兼豆大每服五丸至七九生薑湯下小兒 1:11 木香分 縮砂 去皮 Đ 枚 乾麥中两 炒 巴豆枚四

動定四周全書 右為粗散每服四錢水 包不下 云浑食前梢熟服 是此治積聚無心腹脹硬如石腹上青脉起飲 息す治積聚氣腹脇堅急心胸脹淌不能飲止聖治積聚氣腹脇堅急心胸脹淌不能飲 又仁匙炒做两湯浸去 荆三棱儿 皮 黄 火 剉两 中產生畫半分煎至六分 青楠皮士的粉 木香 桂心雨 焙浸 柳 桃

請我九出聖海 梹柳九命 て!!!!!! 惡心嘔吐不思飲食可持氣類 右為粗散每服三錢水一中盞煎至六分去滓食前 梹榔 梢熱服當利下惡物為度木利再服 做皮 Listen 18 三錢 黄 * 赴 治積聚心腹脹淌宿食不消污刺 陳皮 川大黄年做 丹浴す ÍŊ 木香 木香中 二錢 至 萌

煮黄丸 金月四月分十二十二 右二味再研入白麵二兩再和同研勻滴水為丸 右為細末醋糊為九如梧桐子大每服十五九至二 煮三十沸撈入冷漿水中沉冰冷一時下一九 雄黄 梧桐子大每服時先煎漿水今沸下樂二十四 日二十四時也加 九米飲下 保 巴豆五线 生薑湯亦可 至微利為度用浸樂水送下 雄用 耒 丸 女口

枳實九出保 瓜带散 とこりを ここう 右為細末燒飯為九如梧桐子大每服十五九水飲 右為細末温水調下 枳實处炒 急丸獨行丸皆急樂也 小带 线 铁治脇下 赤小豆丝 **授癖痛如神** 白术 一两 一錢以吐為度如傷之太重備 ŧ

治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾忽發熱妄語出 治氣不下降飲食難消萬靈九主之 **副京四届全書** 杏人一 肉為度 脹煮黄丸主之 煮蘆根飲之 下治飲食不化腹膨悶梹榔主之如甚則脇 通甘治食狗肉不消心腹脹急發熱多語 一升去皮火以水三升煎滓取汁為三服 卷一百七十 肋 虚

上積聚脹湍坐木	9		THA MARKET W	-					-
展之	•					1			#
展之	•	l		}		!			11
展之		ì		l	٠.	l	1		孭
展之	1	Ì]	ļ			177	B 3
展之		i		1	1			3	3
展之	•	ļ	1	i	l	l	1	林儿	AF
展之	Ė			l	Ì	1		li	717
展之	•			l	l	ĺ		73	浦
展之			l	İ		l	i	去	18. 4
展之	_			l	ļ	l	1	14.	半二
展之				1	l	l		3+	木
				1	l	1		ap	
				1	İ		l	ル	
	,			(1]	ł	<i>》</i>	
	j.			1	İ	1	!		
	*			ł	l		1		ĺ
	4	'		l	l	l	1		İ
	,			l		ļ	İ		
<u>F</u>				İ	ĺ				
			1	l	ŀ		!	1	ŀ
	ĺ			ł	!		,	1	l
				l		l)	•	
<u>*</u>		1		ł	1		ì	1	ĺ
<u>F</u>				1					
Ť.									
<u>F</u>				1					
<u>F</u>									
	Ŧ					l			
	٦								
				1					
<u> </u>									
	لِ								

善濟方卷一百七十一			M200		一 一 一 一 一 一 一 一 一
百七十					灭
					参一百七十一
	no				